

| العلاج | مضاعفاتها | الأعراض | مدة الحضانة | طرق العدوى | تعريفه وسببه | المرض |
|---|--|---|--------------------------|--|--|-------------------------------|
| <p>يكون العلاج فعالاً في المرحلتين الأولى والثانية بواسطة المضادات الحيوية وتنقص فعاليتها في المرحلة الأخيرة</p> | <p>- شلل نصفي ثم عام - الموت - عند إصابة المرأة الحامل ينتقل المرض إلى الجنين مما يؤدي إلى أصابته بتشوهات تنتج عنها عاهات مستديمة أو الموت</p> | <p>المرحلة الأولى: - قرحة منفردة وغير مؤلمة مكان دخول الجرثومة - انتفاخ العقد اللمفاوية المرحلة الثانية: - اختفاء القرحة - ظهور بقع جلدية حمراء في الجسم - التهاب الأغشية المخاطية المرحلة الثالثة: - ظهور التهابات على مستوى الجلد والعظام - إصابة القلب والجهاز العصبي</p> | <p>من 3 إلى 5 أسابيع</p> | <p>- ينتقل بالدرجة الأولى عن طريق الاتصال الجنسي - عن طريق الدم - عبر المشيمة من الأم إلى الجنين (الزهري المولدي)</p> | <p>مرض تعفني بكتيري بسيط إذا عولج في بدايته وخطير إذا أهمل. تسببه بكتريا تسمى اللولبية الشاحبة Treponema pallidum</p> | <p>الزهري syphilis</p> |

| | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|-----------------------|--|--|
| <p>يتم علاج المرض في بدايته بواسطة المضادات الحيوية</p> | <p>- التهاب الجهاز التناسلي مما يؤدي إلى العقم - العمى عند الوليد في حالة إصابة الحامل</p> | <p>- حكة واحمرار على مستوى الأعضاء التناسلية - حرقة حادة عند التبول - قيح</p> | <p>من 4 إلى 7 أيام</p> | <p>الإتصال الجنسي</p> | <p>مرض تعفني بكتيري يصيب الجهاز التناسلي والبولي، تسببه بكتريا تدعى الكونوكوك Gonocoque</p> | <p>السيلان Blénnoragie</p> |
| <p>يعالج المرض في بدايته بواسطة المضادات الحيوية</p> | <p>تورم العقد اللمفاوية في جدار الفخذ</p> | <p>ظهور قرحة تناسلية جد مؤلمة على الجهاز التناسلي</p> | <p>من 3 إلى 6 أيام</p> | <p>الاتصال الجنسي</p> | <p>مرض تعفني بكتيري تسببه بكتريا تسمى عصيات دوكري Bacille de Ducrey</p> | <p>القرحة الرخوة chancere</p> |

| | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|---|---|---|
| <p>ليس هناك علاج ضد هذا الداء ولا تلقيح، وتبقى الوقاية خير وسيلة لتفادي الإصابة به</p> | <p>تدهور عام لصحة المريض يؤدي إلى وفاته</p> | <ul style="list-style-type: none"> - المرحلة الأولى: بدون أعراض - المرحلة الثانية: ارتفاع درجة الحرارة، تعب، انخفاض الوزن - المرحلة الثالثة: إصابة جميع أعضاء الجسم بالتهابات جرثومية وأمراض انتهازية | <p>من 5 إلى 11 سنة</p> | <ul style="list-style-type: none"> - الاتصال الجنسي مع شريك مصاب - نقل الدم من واهب مصاب - استعمال الأدوات الحادة غير معقمة أو ملوثة بالدم - من المرأة الحامل أو المرضع إلى طفلها | <p>مرض تعفني فيروسي خطير يصيب جهاز المناعة ويحطمه، يسببه فيروس VIH</p> | <p>السيدا SIDA</p> |
| <p>لا يوجد علاج ضد هذا الداء، ويبقى التلقيح خير وسيلة للوقاية منه</p> | <ul style="list-style-type: none"> - التهاب الكبد المزمن - تشمع الكبد - سرطان الكبد | <ul style="list-style-type: none"> - اصفرار العينين والكبد - تحول البول إلى اللون الداكن - تحول البراز إلى اللون الفاتح - عياء عام، دوخة، تقيؤ | <p>قد تصل إلى 6 أشهر</p> | <p>يوجد فيروس HBV في جل افرازات المصاب (الدم، المنى، الإفرازات المهبلية، اللعاب، الحليب، البول والبراز)</p> | <p>مرض يسببه فيروس HBV</p> | <p>الكبد B Hépatite B</p> |